

LIZ-Następcze działanie herbicydów

zastosowanych w przedplonie buraków cukrowych


Uprawa buraków

przy stosowaniu herbicydu:

 przed 2 laty
jesień

wiosna

przed rokiem

 jesień
(po likwidacji uprawy)

	uprawa możliwa bez ograniczeń
15	po uprawie mieszającej glebę (min. ... cm)
25	po orce (min. ...cm)
	uprawa nie jest możliwa / nie jest zalecana
	brak zaleceń dot. herbicydu w tym terminie

Herbicydy

Accent 74 WG				
Agritox 500 SL				
Agro Diflufenikan 500 SC				
Agro Metazachlor 500 SC				
Agrosulfuron 750 WP				
Agroxone 500 SL				
Afalon Dyspersyjny 450 SC				
Alister 162 OD				
Alister Grande 190 OD				
Amido Stefes 75 WG				
Aminopielik D 450 SL				
Aminopielik Gold 530 EW				
Aminopielik Max 570 SL				
Aminopielik Standard 600 SL				
Aminopielik Super 464 SL				
Amnapielik Tercet 500 SL				
Apyros 75 WG				
Aramo 050 EC				
Asulox 400 SL				
Atlantis 04 WG				
Attribut 70 SG				
Attribut 70 WG				
Aurora 40 WG				
Axial 100 EC				
Basagran DP 566 SL				
Bifenix N 499 SC				
Bison 83 WG				
Boreal 58 WG				
Brasiherb 400CS				
Bromotril 250 SC				
Butisan Star 416 SC			15	
Butisan DUO 400 EC				
Butisan 400 SC				
Butoxone M 400 SL				
Callisto 100 SC		25*		*nie w przyp. niskiego pH, suszy, małej zaw. subst. organicznej
Cambio 410 SL				
Carat 350 SC				
Chisel 75 WG				
Chwastox 500 SL				
Chwastox 750 SL				
Chwastox AS 600 EC				
Chwastox D 179 SL				
Chwastox Duo				
Chwastox Extra 300 SL				
Chwastox M 210 SL				
Chwastox Trio 540 SL				
Chwastox Turbo 340 SL				
Click 500 SC				
Colzor Trio 405 EC				
Command 360 CS				
Command 480 EC				
Cougar 600 SC				
Criptic 400 EC				
Devrinol 450 SC				
Dicoherb 750 SL				
Dicopur 600 SL				
Dicupur Top 464 SL				
Diflanil 500 SC				
Dikamba 480 SL				
Dragon 450 WG		15*		* po upływie 11-13 miesięcy
Dual Gold 960 EC				
Duplosan DP 600 SL				
Emblem 20 WP				
Escort 263 EC		*		* po upływie 12 miesięcy
Esteron 564 EC				
Expert 60 WG				min. 3 miesiące po oprysku
Expert 600 SC				min. 3 miesiące po oprysku
Expert Met 56 WG				
Factor 365 SE				
Fantom 069 EW				
Fernando 225 EC				
Fortel 61,5 WG				
Fox 480 SC				
Fuego 500 SG				
Galeria 334 SL				
Galigan 240 EC				
Glean 75 WG				
Goal 240 EC			25	
Goal 480 EC			25	



Uprawa buraków
przy stosowaniu herbicydu:

przed 2 laty
jesień

wiosna

przed rokiem

jesień

(po likwidacji uprawy)

	uprawa możliwa bez ograniczeń
15	po uprawie mieszającej glebę (min. ... cm)
25	po orce (min. ...cm)
	uprawa nie jest możliwa / nie jest zalecana
	brak zaleceń dot. herbicydu w tym terminie

Herbicydy

Gold 450 EC			
Graman 050 EC			
Granstar 75 WG			
Granstar Strong			
Grasp 250 SC			
Grodyl 75 WG			
Guardian 840 EC			
Guardian CompleteMix 664 SE			
Hector 53,6 WG			
Helm-Sulfi 75 WG			
Huzar 05 WG			
Innovate 240 SC			
Izoherb 500 SC			
Kalif 480 EC			
Kalif Mega 283 EC			
Kantor 050 SC			
Kerb 50 WP			
Komplet 560 SC			
Laudis 050 SC			
Legato 500 SC			
Lentipur Flo 500 SC			
Legato Plus 600 SC			
Lintur 70 WG			
Linurex 50 WP			
Lumax 537,5 SE			
Maczuga 75 WG			
Maister 310 WG			
Merlin Super 537 SC			
Merlin Super 750 WG			
Metaz 500 SC			
Metazanex 500 SC			
Milagro 040 SC			
Milagro Extra 6 OD			
Mocarz 75 WG			
Mustang 306 SE			
Nimbus 283 SE			
Nikos 040 SC			
Optica Combi 600 SL			
Optica Duo 600 SL			
Optica Trio 600 SL			
Panida 330 EC			
Pelican 500 SC			
Pelican Plus 550 SC			
Pielik 85 SP			
Plateen 41,5 WG			
Primextra Gold 720 SC			
Pronap Extra 430 EC			
Proponit 720 EC			
Protugan 500 SC			
Puma Universal 069 EW			
Racer 250 EC			
Rapsan 500 SC			
Reactor 480 EC			
Refine 75 WG			
Quazar 550 SC			
Satecid 65 WP			
Sekator 6,25 WG			
Sekator 125 OD			
Segal 65 WG			
Shado 300 SC			
Snajper 600 SC			
Solar 200 EC			
Spotlight Plus 060 EO			
Starane Super 101 SE			
Stomp 330 EC			
Stomp 400 EC			
Succesor T 550 SE			
Szabla 480 EC			
Tazastomp 500 SC			
Teridox 500 EC			
Titus 25 WG			
Trophy 768 EC			
Trophy 840 EC			
Tolurex 500 SC			
Tolurex 80 WP			
Tomigan 250 EC			
U 46 M-Fluid 500 SL			
Zeagran 340 SE			
Zeus 208 WG			

nie na glebach lekkich

* po 12 miesiącach po oprysku